

**Liite 4****Position 12 vaatimuksia tarkentavat tiedot**


Kohdun irtosolunäytteiden joukkotutkimusten toteutus.

Seulonnat suoritetaan valtakunnallisten suositusten mukaan viiden vuoden välein 25–65 –vuotiaille.

Perus seulontatutkimuksena on suuren riskin papilloomavirustestiin (hrHPV-testi) perustuva validoitu seulontatesti. Papa-näyte tutkitaan vain, jos hrHPV-testi on positiivinen, eli noin 8 %:ssa tapauksista. Jos Papa-testi on poikkeava, jatkotutkimukset ja niiden kiireellisyys määräytyvät Käypä hoito-suosituksen mukaisesti. Mikäli Papa-testissä ei havaita poikkeavaa positiivisen hrHPV-testin jälkeen, naiselle lähetetään kutsu riskiryhmätutkimukseen ja tällöin hän tulee uuteen hrHPV- ja Papa-tutkimukseen 13–24 kuukauden kuluttua ensimmäisestä näytteenotosta (Kuva 1).

Tutkimusten mukaan Papa-testiä suositellaan ainoana seulontatestinä vain alle 30-vuotiaille.

**Kuva 1.** Kansallisen suosituksen mukaiset kohdunkaulasyövän seulonnan testit ja seulontamenettely



\*Käypä hoito –suosituksen määrittämällä kiireellisyydellä?